

Bellone

| fico | FAMIGLIA | GENERE | SPECIE | NOME |
|------|----------|--------|-----------------|---------|
| | Moracee | Ficus | Ficus Carica L. | Bellone |

| foglia | FORMA | MARGINE | FORMA FOGLIA CENTRALE | FORMA FOGLIE LATERALI | SENO PEZIOLARE |
|--------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Intera | Ondulato | Ovale | Ovata conica | a V |

| albero | PORTAMENTO ALBERO | VIGORIA | PORTAMENTO RAMO | ESCRESCENZA CORTICALE | GEMMA APICALE |
|--------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | Aperto | Media | Ricurvo | Tuberi corticali | Conica |



| Frutto (fornito) | PESO | FORMA | I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA) | POSIZIONE DIAMETRO MAX | APICE | OSTIOLO | SCAGLIE DELL'OSTIOLO | COLLO | COLORE FONDO BUCCIA | SOVRACCOLORE BUCCIA | COLORE POLPA | LENTICELLE | COSTOLATURA | FENDITURE |
|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | Basso (20-50)g | Piriforme appiattita | Oblungo | Piriforme (verso l'ostiole) | Piatto | Depresso | Chiuse | Presente | Nero-violaceo | Assente | Rosso scuro | Abbondanti | Presente | Presenti |

| Frutto (fiorone) | PESO | FORMA | I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA) | POSIZIONE DIAMETRO MAX | APICE | OSTIOLO | SCAGLIE DELL'OSTIOLO | COLLO | COLORE FONDO BUCCIA | SOVRACCOLORE BUCCIA | COLORE POLPA | LENTICELLE | COSTOLATURA | FENDITURE |
|------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | Medio (50-90)g | Piriforme | Oblungo | Piriforme (verso l'ostiole) | Piatto | Depresso | Aperte | Presente | Violaceo | Regolare bande verdi | Rosa (rosso) | Presenti | Presente | Assenti |

| Fenologia | TIPO DI FRUTTIFICAZIONE | INIZIO GERMOGLIAMENTO | MATURAZIONE FIORONI | MATURAZIONE FORNITI | NOTE |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Bifera | Tardivo | Precoce | Precoce | Nero di Nizza, Francia, diffuso nella zona del Nizzardo. Il nome deriva dalla presenza di numero se lenticelle bianche su una epidermide scura, che lo rendono simile a un cielo stellato (notte stellata). Descritto per la prima volta da Sauvaigo nel 1889, come la Regina dei Fichi. |

