

# Caprifico della coda

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Caprifico della coda

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Eterofilla	Seghettato	Pentagonale	Ovata	a V

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Semi-eretto	Media	Ricurvo	Tuberi corticali	Conica



Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE

Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
		Tardivo		Media	Proveniente da Cisternino, dove è abbastanza comune. E' un caprifico verde. In funzione del periodo di scioglimento i caprifici influenzano la fecondazione dei fichi ad ostiolo aperto. Utile a caprificare il Petrelli, di solito a luglio. Sia Petrelli che Tauro necessitano di caprificazione per portare a termine in forniti autunnali.

