

Citrulara (tritulara)

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Citrulara (tritulara)

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Trilobata	Seghettato	Triangolare	Obovata	a U

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Semi-eretto	Media	Ricurvo	Gonfiore nodali	Conica



Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Molto basso (<20g)	Piriforme allungata	Oblungo	Ovoide (centro)	Piatto	Piatto	Chiuse	Assente	Nero-violaceo	Assente	Rosa (rosso)	Presenti	Presente	Presenti

Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Basso (20-50g)	Piriforme	Oblungo	Piriforme (verso l'ostiole)	Semi sferico	Rialzato	Aperte	Presente	Nero-violaceo	Assente	Rosa (rosso)	Presenti	Presente	Assenti

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
	Bifera	Medio	Tardiva	Tardiva	È il tipico fiorone nero calabrese (come il Tauro per i pugliesi), ottimo, con produzione di fioroni molto abbondante. In clima nordico produce molti fioroni a scapito dei forniti.

