


## Fico d'inverno C.da Saettone

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Fico d'inverno C.da Saettone

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Trilobata	Seghettato	Obovate	Obovata	A grappa

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Aperto	Bassa	Ricurvo	Grumi	Conica



Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Basso (20-50)g	Piriforme	Oblungo	Piriforme (verso l'ostiole)	Piatto	Piatto	Chiuse	Presente	Verde	Assente	Rosso scuro	Presenti	Presente	Presenti

Frutto (forone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
	Unifera	Medio		Tardiva	Fico molto tardivo - fruttifica a metà ottobre- novembre. Di lenta entrata in produzione, di qualità discreta per l'epoca.