

Figo moro de Caneva

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Figo moro de Caneva

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Trilobata	Ondulato	Pentagonale	Ovata conica	a V

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Aperto	Medio-bassa	Ricurvo	Gonfiore nodali	Conica

Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Molto basso (<20g)	Piriforme allungata	Oblungo	Piriforme (verso l'ostiole)	Semi sferico	Rialzato	Chiuse	Presente	Nero-violaceo	Assente	Ambrato	Presenti	Marcata	Assenti

Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Basso (20-50)g	Piriforme allungata	Oblungo	Piriforme (verso l'ostiole)	Semi sferico	Rialzato	Chiuse	Presente	Nero-violaceo	Assente	Rosso	Abbondanti	Marcata	Assenti

Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE
	Bifera	Molto tardivo	Tardiva	Media	Ottimo fico, diffuso in parti del Veneto e del Friuli V.G., con un attivo Consorzio di promozione.

