

Pastiliere

| fico | FAMIGLIA | GENERE | SPECIE | NOME |
|------|----------|--------|-----------------|------------|
| | Moracee | Ficus | Ficus Carica L. | Pastiliere |

| foglia | FORMA | MARGINE | FORMA FOGLIA CENTRALE | FORMA FOGLIE LATERALI | SENO PEZIOLARE |
|--------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Pentalobata | Seghettato | Ovale | Ovata conica | A Graffa |

| albero | PORTAMENTO ALBERO | VIGORIA | PORTAMENTO RAMO | ESCRESCENZA CORTICALE | GEMMA APICALE |
|--------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | Espanso | Media-elevata | Sinuoso | Tuberi corticali | Conica |

| Frutto (fornito) | PESO | FORMA | I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA) | POSIZIONE DIAMETRO MAX | APICE | OSTIOLO | SCAGLIE DELL'OSTIOLO | COLLO | COLORE FONDO BUCCIA | SOVRACCOLORE BUCCIA | COLORE POLPA | LENTICELLE | COSTOLATURA | FENDITURE |
|------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|--------|----------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | Basso (20-50)g | Globosa | Globoso | Ovoide | Piatto | Depresso | Aperte | Assente | Nero-violaceo | Assente | Rosso scuro | Assenti | Presente | |

| Frutto (fiorone) | PESO | FORMA | I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA) | POSIZIONE DIAMETRO MAX | APICE | OSTIOLO | SCAGLIE DELL'OSTIOLO | COLLO | COLORE FONDO BUCCIA | SOVRACCOLORE BUCCIA | COLORE POLPA | LENTICELLE | COSTOLATURA | FENDITURE |
|------------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------|----------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | Basso (20-50)g | Asimmetrica | Oblungo | Piri forme (verso l'ostiole) | Piatto | Depresso | Aperte | Assente | Nero-violaceo | Assente | Rosa (rosso) | Presenti | Presente | Assenti |

| Fenologia | TIPO DI FRUTTIFICAZIONE | INIZIO GERMOGLIAMENTO | MATURAZIONE FIORONI | MATURAZIONE FORNITI | NOTE |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Bifera | Molto tardivo | Precoce | Precoce | Dalla Francia, forse il migliore dei neri. Produzione concentratissima, dagli inizi a fine agosto (max 30 giorni), molto abbondante in loco. Con foglia vellutata. Frutto con polpa di colore rosso scuro a maturazione (come sangue rappreso). Sa pure equilibrato molto buono e con profumi floreali, che si distinguono rispetto agli altri sapori. Descritta nel 1869 in California, ma anche nel 1845 nella zona di Napoli sotto il nome di Ficus Hirta (Gasparrini). |

