

# San Biagio

|      |          |        |                 |            |
|------|----------|--------|-----------------|------------|
| fico | FAMIGLIA | GENERE | SPECIE          | NOME       |
|      | Moracee  | Ficus  | Ficus Carica L. | San Biagio |

|        |        |            |                       |                       |                |
|--------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| foglia | FORMA  | MARGINE    | FORMA FOGLIA CENTRALE | FORMA FOGLIE LATERALI | SENO PEZIOLARE |
|        | Intera | Seghettato | Ovale                 | Ovata conica          | A graffa       |

|        |                   |         |                 |                       |               |
|--------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------|
| albero | PORTAMENTO ALBERO | VIGORIA | PORTAMENTO RAMO | ESCRESCENZA CORTICALE | GEMMA APICALE |
|        | Espanso           | Media   | Sinuoso         | Tuberi corticali      | Conica        |

|                  |                |                      |                         |                              |        |          |                      |         |                     |                       |              |            |             |           |
|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|----------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Frutto (fornito) | PESO           | FORMA                | I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA) | POSIZIONE DIAMETRO MAX       | APICE  | OSTIOLO  | SCAGLIE DELL'OSTIOLO | COLLO   | COLORE FONDO BUCCIA | SOVRACCOLORE BUCCIA   | COLORE POLPA | LENTICELLE | COSTOLATURA | FENDITURE |
|                  | Basso (20-50)g | Piriforme appiattita | Globoso                 | Piri forme (verso l'ostiole) | Piatto | Depresso | Aperte               | Assente | Giallo-verde        | Regolare bande gialle | Rosso        | Assenti    | Marcata     | Assenti   |

|                  |                |             |                         |                              |        |          |                      |          |                     |                      |              |            |             |           |
|------------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Frutto (fiorone) | PESO           | FORMA       | I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA) | POSIZIONE DIAMETRO MAX       | APICE  | OSTIOLO  | SCAGLIE DELL'OSTIOLO | COLLO    | COLORE FONDO BUCCIA | SOVRACCOLORE BUCCIA  | COLORE POLPA | LENTICELLE | COSTOLATURA | FENDITURE |
|                  | Basso (20-50)g | Asimmetrica | Globoso                 | Piri forme (verso l'ostiole) | Piatto | Depresso | Chiuse               | Ass/pres | Giallo-verde        | Regolare bande verdi | Rosso        | Presenti   | Presente    | Assenti   |

|           |                         |                       |                     |                     |  |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Fenologia | TIPO DI FRUTTIFICAZIONE | INIZIO GERMOGLIAMENTO | MATURAZIONE FIORONI | MATURAZIONE FORNITI | NOTE   |
|           | Bifera                  | Tardivo               | Media               | Precoce             | Tra le varietà di minifico più interessanti, soprattutto per il consumo familiare a causa della poca resistenza alle manipolazioni. Ottimo sapore. |

