




Testa di gatto

fico	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME
	Moracee	Ficus	Ficus Carica L.	Testa di gatto

foglia	FORMA	MARGINE	FORMA FOGLIA CENTRALE	FORMA FOGLIE LATERALI	SENO PEZIOLARE
	Trilobata	Ondulato	Pentagonale	Obovata	A graffa

albero	PORTAMENTO ALBERO	VIGORIA	PORTAMENTO RAMO	ESCRESCENZA CORTICALE	GEMMA APICALE
	Semi-eretto	Medio-bassa	Lineare	Tuberi corticali	Conica



Frutto (fornito)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Medio (50-90)g	Piriforme appiattita	Oblungo	Piriforme (verso l'ostiole)	Piatto	Depresso	Aperte	Assente	Violaceo	Assente	Bianco (giallo-bianco)	Assenti	Presente	Assenti
Frutto (fiorone)	PESO	FORMA	I (LARGHEZZA/LUNGHEZZA)	POSIZIONE DIAMETRO MAX	APICE	OSTIOLO	SCAGLIE DELL'OSTIOLO	COLLO	COLORE FONDO BUCCIA	SOVRACCOLORE BUCCIA	COLORE POLPA	LENTICELLE	COSTOLATURA	FENDITURE
	Basso (20-50)g	Piriforme appiattita	Oblungo	Piriforme (verso l'ostiole)	Piatto	Depresso	Chiuse	Presente	Nero-violaceo	Assente	Ambrato	Abbondanti	Marcata	Assenti
Fenologia	TIPO DI FRUTTIFICAZIONE	INIZIO GERMOGLIAMENTO	MATURAZIONE FIORONI	MATURAZIONE FORNITI	NOTE									
	Bifera	Tardivo	Tardiva	Precoce	Proveniente dalla Basilicata. Bifera medio tardiva a frutti grossi. Presente nel sud est barese. Apprezzati sia i fichi che i fioroni. Buona resistenza alle manipolazioni.									

